



CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT EXPOSANT AU SANG OU AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES

PREMIERS SOINS

Après piqûre ou blessure cutanée :

- Nettoyer immédiatement la plaie à l'eau courante et au savon
- Rincer
- Désinfecter de préférence avec du DAKIN (sinon avec de l'eau de javel à 12 degrés diluée à 1/10 ou de la Bétadine dermique ou à défaut alcool à 70°)
- Laisser agir le désinfectant sur la plaie pendant au moins 5 minutes.

Après projection sur les muqueuses : sur les yeux, le nez ou dans la bouche :

- Rincer abondamment avec du sérum physiologique si possible, sinon à l'eau courant pendant au moins cinq minutes.

SE RENDRE AUX URGENCES DE L'HOPITAL LE PLUS TOT POSSIBLE

TEL DES URGENCES 05.46.45.66.26

(Laboratoire d'analyses de biologie médicale)

Le médecin des urgences décidera de la conduite à tenir vis-à-vis du risque de contamination infectieuse (infection VIH, Hépatite B, Hépatite C, autres infections) et d'un éventuel protocole de traitement.

PREVENIR LE RESPONSABLE DE L'ENTREPRISE

Nom :  :

- Faire une déclaration d'accident du travail dans les 48 heures

INFORMER LE MEDECIN DU TRAVAIL

Docteur :

 :



**DANS TOUS LES CAS ANALYSER LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT AVEC LE MEDECIN DU TRAVAIL
AFIN D'EVITER QU'IL NE SE REPRODUISE**