



CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT EXPOSANT AU SANG OU AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES

PREMIERS SOINS

Après piqûre ou blessure cutanée :

- Nettoyer immédiatement la plaie à l'eau courante et au savon
- Rincer
- Désinfecter de préférence avec du DAKIN (sinon avec de l'eau de javel à 12 degrés diluée à 1/10 ou de la Bétadine dermique ou à défaut alcool à 70°)
- Laisser agir le désinfectant sur la plaie pendant au moins 5 minutes.

Après projection sur les muqueuses : sur les yeux, le nez ou dans la bouche :

- Rincer abondamment avec du sérum physiologique si possible, sinon à l'eau courant pendant au moins cinq minutes.

SE RENDRE AUX URGENCES DE L'HOPITAL LE PLUS TOT POSSIBLE

APPELER LE 15

Le médecin des urgences décidera de la conduite à tenir vis-à-vis du risque de contamination infectieuse (infection VIH, Hépatite B, Hépatite C, autres infections) et d'un éventuel protocole de traitement.

PREVENIR LE RESPONSABLE DE L'ENTREPRISE

Nom :  :

- Faire une déclaration d'accident du travail dans les 48 heures

INFORMER LE MEDECIN DU TRAVAIL

Docteur :



**DANS TOUS LES CAS ANALYSER LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT AVEC LE MEDECIN DU TRAVAIL
AFIN D'EVITER QU'IL NE SE REPRODUISE**